


Exercices de routine

6.5 nos. 3, 7.

9.4 nos. 1, 11, 13.

Applications des intégrales doubles

1. Calculez la masse d'une plaque mince occupant la région du plan définie par $25y \geq (x+5)(5-x)$, $x \geq y^2 - 5$ et $x \leq 5 - y^2$ si la densité de la plaque est proportionnelle au cube la distance à l'axe des x .
2. La section transversale S d'une pièce métallique de densité constante et de longueur égale à 2 a la forme représentée ci-dessous. Cette section peut être modélisée par la région du plan située entre le carré de sommets $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$, $(1, -1)$ et la courbes polaire et $r = 3 + \sin^2(4\theta)$. Calculez la masse de la pièce métallique.



3. Déterminez les coordonnées du centre de masse de la plaque mince de l'exercice 1. Le centre de masse est-il situé sur la plaque? Justifiez soigneusement votre réponse.
4. On considère la plaque mince de l'exercice 2.
 - (a) Sans faire de calculs, déterminez les coordonnées du centre de masse de la plaque. Justifiez soigneusement votre réponse.
 - (b) Si, plutôt qu'être constante, la densité de la plaque est proportionnelle à la distance au coin supérieur droit du « trou » carré en son centre, est-ce que le centre de masse est au même endroit?
5. On considère une plaque mince occupant la région D située au-dessus de la droite $y = 0$ et en dessous des paraboles $y = (x + 1)^2$ et $y = (x - 1)^2$. La densité de cette plaque est proportionnelle à la distance à l'axe des x .
 - (a) Calculez le moment d'inertie (second moment) de la plaque par rapport à l'axe vertical $x = 1$ (l'axe A_1).
 - (b) Calculez le moment d'inertie (second moment) de la plaque par rapport à l'axe horizontal $y = 1$ (l'axe A_2).
 - (c) Est-il plus facile de faire tourner la plaque autour de l'axe A_1 ou autour de l'axe A_2 ?

Vous devez justifier vos démarches et vos réponses rigoureusement en utilisant des concepts du cours.

Théorème de Green

6. À l'aide du théorème de Green, évaluez l'intégrale suivante

$$J_1 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$


où $\vec{F}(x, y) = (x + y)\vec{i} + (xy + \sin(y^2))\vec{j}$ et C est le triangle de sommets $(0, 0)$, $(1, 1)$ et $(2, 0)$, orienté dans le sens horaire.

7. Calculez le travail effectué par le champ vectoriel

$$\vec{F}(x, y) = (x^2 + y^2)\vec{i} + (xy - \ln(y^2 + 1))\vec{j}$$


le long de la partie C de la parabole $y = x^2 - 4$ située en dessous de l'axe des x . La courbe C est orientée de « gauche à droite » lorsqu'on la dessine avec les axes de coordonnées en position habituelle.

8. Soit $C = C_1 \cup C_2$, où C_1 est le segment reliant le point $(2, -2)$ au point $(2, 2)$ et C_2 est une courbe quelconque reliant ces deux mêmes points. Sachant que C délimite une aire égale à 12, calculez le travail du champ vectoriel défini par $\vec{F}(x, y) = (y - \sin(x^2))\vec{i} + (5x - 5y^2)\vec{j}$ le long de la courbe C_2 .
9. Soit C la courbe, appelée *astroïde*, paramétrée par $\vec{r}(t) = \sin^3(t)\vec{i} + \cos^3(t)\vec{j}$ avec $0 \leq t \leq 2\pi$ et représentée ci-dessous.



Calculez l'aire délimitée par la courbe C .

10. La courbe C illustrée ci-dessous est paramétrée par $\vec{r}(t) = [\cos(2t) + 3\cos(t)]\vec{i} + 3\sin(2t)\vec{j}$ avec $-\pi/2 \leq t \leq 3\pi/2$.



- (a) Calculez l'aire de chacune des boucles de la courbe C .

(b) Donnez une interprétation géométrique de l'intégrale $\oint_C x dy$. Que vaut cette intégrale ?

11. On considère une plaque mince de densité constante occupant un domaine D du plan délimité par une courbe C .

(a) Montrez que les coordonnées du centre de masse de la plaque sont


$$\bar{x} = \frac{1}{2A} \oint_C x^2 dy, \quad \text{et} \quad \bar{y} = -\frac{1}{2A} \oint_C y^2 dx,$$

où A est l'aire de D . Ici, vous devez utiliser la forme du théorème de Green donnée à la p. 420 du livre.


(b) Utilisez le résultat de la partie (a) pour déterminer les coordonnées du centre de masse d'une plaque mince occupant le domaine délimité par la courbe C paramétrée par

$$\vec{r}(t) = [\cos(t) - \sin(t)]\vec{i} + [\cos(t)\sin(t) + \sin(t)]\vec{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

et représentée ci-dessous.



12. Le théorème de Green peut être généralisé à des courbes qui sont constituées de plusieurs morceaux, si celles-ci sont orientées correctement de façon à ce que la région D qu'elles délimitent soit toujours à gauche lorsqu'on parcourt la courbe (*l'orientation positive*). Ceci est illustré ci-dessus et également à la page 423 du livre.



Dans ce cas, $C = C_1 \cup C_2$ et le théorème de Green devient :


$$\oint_{C_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \oint_{C_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D (Q_x - P_y) dA,$$

où $\vec{F} = P\vec{i} + Q\vec{j}$ et D est le domaine entre les deux courbes (en bleu sur la figure).

Utilisez cette généralisation pour calculer l'intégrale

$$J_3 = \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r},$$

où $\vec{F}(x, y) = [\cos(x) - xy^2]\vec{i} + [\sin(y) - 2x^2]\vec{j}$ et D est la région située entre les deux cercle représentés ci-dessous. La courbe C est orientée positivement au sens généralisé.



Exercices supplémentaires

À faire au besoin.

6.5 nos. 13, 15, 20.

9.4 nos. 13, 23, 33.