

MTH1102(D) - Exercices du TD7

Exercices de routine

7.2 nos. 7, 9, 11, 23, 25, 27.

7.3 nos. 3, 7, 9.

7.4 nos. 7, 9.

Intégrales triples en coordonnées cylindriques

1. Soit E la région bornée par les surfaces $z = 9 - x^2$ et $z = y^2$. Évaluez l'intégrale

$$J_1 = \iiint_E z \, dV.$$

2. Soit E la région située au-dessus du plan $z = 0$ et à la fois en dessous du parabolôide $z = 4 - x^2 - y^2$ et du cône $z^2 = 2x^2 + 2y^2$. Évaluez l'intégrale

$$J_2 = \iiint_E (x^2 + y^2) \, dV.$$

3. Soit E la région délimitée par le parabolôide $z = x^2 + y^2$ et le plan $z = 2x$. Évaluez l'intégrale

$$J_3 = \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} \, dV.$$

Intégrales triples en coordonnées sphériques

4. Soit E la région du premier octant (là où $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) située au-dessus du cône $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ et à l'intérieur de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 100$. Évaluez l'intégrale

$$J_4 = \iiint_E z^2 \, dV.$$

5. Soit E la région située à l'intérieur de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 5$ et entre les deux nappes du cône $z^2 = x^2 + y^2$. Évaluez l'intégrale

$$J_5 = \iiint_E \sqrt{x^2 + y^2} \, dV.$$

6. Soit E la région située au-dessus du plan $z = 2$ et à l'intérieur de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 16$. Évaluez l'intégrale


$$J_6 = \iiint_E \frac{x^2}{x^2 + y^2 + z^2} \, dV.$$

$$\text{Indice pour le calcul : } \frac{\sin^3(x)}{\cos^3(x)} = \frac{\sin(x)(1 - \cos^2(x))}{\cos^3(x)}.$$

Applications

7. Calculez le volume de la région E située entre les parabolôides $z = 4 - 2x^2 - 2y^2$ et $z = 2 - x^2 - y^2$.
8. Un solide occupe la région B de l'espace située à l'extérieur de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ et à l'intérieur de la sphère $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$. La densité du solide est inversement proportionnelle à la distance à l'origine.


- (a) Déterminez les coordonnées du centre de masse du solide.
 (b) Le centre de masse est-il à l'intérieur du solide ?
 9. Soit B un solide ayant la forme d'une boule (sphère solide) percée d'un trou conique, comme illustré ci-dessous.



Ce solide peut être modélisé comme étant la région de l'espace située à l'intérieur de la sphère $x^2 + y^2 + (z - 5)^2 = 25$ et sous le cône $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$.

- (a) Décrivez le solide B en coordonnées cylindriques.
 (b) Décrivez le solide B en coordonnées sphériques.
 (c) Calculez la hauteur moyenne des points de E (par rapport au plan $z = 0$).
 10. Soit E la région de l'espace située
- à droite du plan $x = 0$ (là où $x \geq 0$)
 - entre les plans $y = -x$ et $y = x$
 - au-dessus du plan $z = 0$
 - à l'intérieur de la sphère d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 4$
 - et « à l'extérieur » du cylindre $x^2 + y^2 = 2$ (c'est-à-dire là où $x^2 + y^2 \geq 2$).

Les surfaces délimitant la région E sont représentées ci-dessous.



- (a) Décrivez la région E en coordonnées cylindriques.
 (b) Décrivez la région E en coordonnées sphériques.
 (c) Un solide occupe la région E . La densité du solide est proportionnelle à la distance à l'axe des z . Déterminez les coordonnées du centre de masse de ce solide.

Exercices supplémentaires

À faire au besoin.

7.1 nos. 19, 39, 45, 47.